


一般-1-a 患者満足度（外来患者） 満足

分子:「満足」と回答した外来患者数

分母:外来患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数

FY2023 - 三菱京都病院 / 全施設



n 249


...	最小値	25%tile	中央値	平均値	75%tile	最大値
	8.86 %	34.13 %	44.35 %	45.70 %	56.13 %	96.57 %

一般-1-b 患者満足度（外来患者） 満足またはやや満足

分子:「満足」または「やや満足」と回答した外来患者数

分母:外来患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数

FY2023 - 三菱京都病院 / 全施設



n 249


...	最小値	25%tile	中央値	—	平均値	75%tile	—	最大値
	46.7 %	77.3 %	84.8 %		82.8 %	90.4 %		99.3 %

一般-2-a 患者満足度（入院患者） 満足

分子：「満足」と回答した入院患者数

分母：入院患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数

FY2023 - 三菱京都病院 / 全施設



n 249


... 最小値 5.19 % 25%tile 50.83 % 中央値 60.77 % 平均値 60.02 % 75%tile 69.92 % 最大値 91.67 %

一般-2-b 患者満足度（入院患者） 満足またはやや満足

分子:「満足」または「やや満足」と回答した入院患者数

分母:入院患者への満足度調査項目「この病院について総合的にはどう思われますか？」の設問有効回答数

FY2023 - 三菱京都病院 / 全施設




n 249

... 最小値 13.6 % 25%tile 86.7 % 中央値 91.4 % 平均値 97.7 % 75%tile 95.3 % 最大値 100.0 %

一般-3-a 入院患者の転倒・転落発生率

分子:医療安全管理室ヘインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数
分母:入院延べ患者数


三菱京都病院 / 全施設



一般-3-b 入院患者の転倒・転落による損傷発生率（損傷レベル2以上）

分子:医療安全管理室ヘインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数のうち損傷レベル2以上の件数
分母:入院延べ患者数


三菱京都病院 / 全施設



一般-3-c 入院患者の転倒・転落による損傷発生率（損傷レベル4以上）

分子:医療安全管理室ヘインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数のうち損傷レベル4以上の件数
分母:入院延べ患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-3-d 65歳以上の入院患者における転倒・転落発生率

分子:65歳以上の入院中の患者に発生した転倒・転落件数

分母:65歳以上の入院患者延べ数


三菱京都病院 / 全施設



一般-4 褥瘡発生率

分子:調査期間における分母対象患者のうち、d2以上の褥瘡の院内新規発生患者数
分母:入院延べ患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-5-a 新規圧迫創傷（褥瘡）発生率

分子:調査期間中にd2（真皮までの損傷）以上の院内新規圧迫創傷発生患者数

分母:調査期間初日（0時時点）の入院患者数＋調査期間に新たに入院した患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-5-b 新規医療関連機器圧迫創傷（MDRPI）発生率

分子: 調査月の新規医療関連機器圧迫創傷（MDRPI）発生患者数

分母: 調査期間初日（0時時点）の入院患者数 + 調査期間に新たに入院した患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-5-c 持ち込み圧迫創傷（褥瘡）率

分子:入院後24時間以内に圧迫創傷発生の記録がある患者数

分母:調査期間に新たに入院した患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-6 紹介割合

分子: (紹介患者数 + 救急患者数)

分母: 初診患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-7 逆紹介割合

分子: 逆紹介患者数

分母: (初診 + 再診患者数)

三菱京都病院 / 全施設




一般-8 症候性尿路感染症発生率

分子:分母のうちカテーテル関連症候性尿路感染症の定義に合致した延べ回数

分母:入院患者における尿道留置カテーテル挿入延べ日数


三菱京都病院 / 全施設



一般-9 救急車・ホットラインの応需率

分子:救急車で来院した患者数
分母:救急車受け入れ要請件数

三菱京都病院 / 全施設




一般-13-a 糖尿病患者の血糖コントロール HbA1c<7.0%

分子:HbA1cの最終値が7.0%未満の外来患者数

分母:糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数


三菱京都病院 / 全施設



一般-13-b 65歳以上の糖尿病患者の血糖コントロール HbA1c<8.0%

分子:HbA1cの最終値が8.0%未満の65歳以上の外来患者数
分母:糖尿病の薬物治療を施行されている外来患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-14 退院後4週間以内の予定外再入院割合

分子: 前回退院から4週間以内に計画外で再入院した患者数

分母: 退院患者数


三菱京都病院 / 全施設



一般-15 退院後7日以内の予定外再入院割合

分子: 前回退院から7日以内に計画外で再入院した患者数
分母: 退院患者数


三菱京都病院 / 全施設



一般-18 脳梗塞患者へのスタチン処方割合

分子:スタチンが投与された患者数
分母:脳梗塞で入院した患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-22 統合指標(Composite Measures)

【脳梗塞】

分子:指標No.17,18,19,20,21の分子の合計

分母:指標No.17,18,19,20,21の分母の合計


三菱京都病院 / 全施設



一般-23-a 1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント報告件数

分子: 調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告件数 × 100
分母: 許可病床数

三菱京都病院 / 全施設




一般-23-b 全報告中医師による報告の占める割合

分子:分母のうち医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数

分母:調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告総件数


三菱京都病院 / 全施設



一般-24 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率

分子:インフルエンザワクチンを予防接種した職員数
分母:職員数

FY2023 - 三菱京都病院 / 全施設



n 259


...	最小値	- - -	25%tile	. - .	中央値	—	平均値	- - -	75%tile	- . -	最大値
	62.6 %		84.7 %		90.4 %		88.8 %		94.5 %		100.0 %

一般-25 糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施割合

分子: 特別食加算の算定回数

分母: 18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数

三菱京都病院 / 全施設




一般-26-a カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用時の血液培養実施率

分子:投与開始初日に血液培養検査を実施した患者数

分母:カルバペネム系注射薬、ニューキノロン系注射薬、抗MRSA薬（バンコマイシン内服は除く）投与を開始した入院患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-26-b カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用までの培養検査実施率

分子:投与開始初日までに培養検査を実施した患者数

分母:カルバペネム系注射薬、ニューキノロン系注射薬、抗MRSA薬（バンコマイシン内服は除く）投与を開始した入院患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-26-c 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合

分子:血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数(人日)

分母:血液培養のオーダー日数(人日)


三菱京都病院 / 全施設



一般-26-d 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（生後28日未満）

分子:血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）
分母:血液培養のオーダー日数（人日）（実施日が生後28日未満）

三菱京都病院 / 全施設




-般-26-e 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（生後28日～2歳未満）

分子:血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）

分母:血液培養のオーダー日数（人日）（実施日が生後28日以上2歳未満）

三菱京都病院 / 全施設




一般-26-f 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（2歳～6歳未満）

分子:血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）

分母:血液培養のオーダー日数（人日）（実施日が2歳以上6歳未満）


三菱京都病院 / 全施設



一般-26-g 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（6歳以上）

分子:血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）
分母:血液培養のオーダー日数（人日）（実施日が6歳以上）


三菱京都病院 / 全施設



一般-27-a 脳卒中患者に対する地域連携の実施割合

分子:地域連携に関する算定のある患者数
分母:脳卒中で入院した患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-27-b 大腿骨頸部骨折患者に対する地域連携の実施割合

分子:地域連携に関する算定のある患者数

分母:大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-28 18歳以上の身体抑制率

分子: (物理的) 身体抑制を実施した患者延べ数

分母: 18歳以上の入院患者延べ数


三菱京都病院 / 全施設



一般-29-a 大腿骨頸部骨折の早期手術割合

分子:入院2日以内に手術を受けた患者数
分母:大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨折の手術を受けた患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-29-b 大腿骨転子部骨折の早期手術割合

分子:入院2日以内に手術を受けた患者数

分母:大腿骨転子部骨折で入院し、大腿骨折の手術を受けた患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-30 シスプラチンを含むがん薬物療法後の急性期予防的制吐剤投与率

分子:実施日の前日または当日に、5HT3受容体拮抗薬、NK1受容体拮抗薬およびデキサメタゾンの3剤すべてを併用した数

分母:18歳以上の患者で、入院にてシスプラチンを含む化学療法を受けた実施日数


三菱京都病院 / 全施設



一般-31 抗MRSA薬投与に対する薬物血中濃度測定割合

分子:薬物血中濃度を測定された患者数
分母:TDMを行うべき抗MRSA薬を投与された患者数


三菱京都病院 / 全施設



一般-32-a 薬剤管理指導実施割合(病棟薬剤業務実施加算の有る医療機関)

分子:薬剤管理指導を受けた患者数
分母:入院患者数

三菱京都病院 / 全施設




一般-33 集中治療を要する重症患者に対する早期栄養介入割合

分子:集中治療室入室後3日以内に栄養介入を受けた患者数

分母:集中治療室に3日間以上連続して入室していた18歳以上の患者数

三菱京都病院 / 全施設



一般-34 アスピリン内服患者の退院時酸分泌抑制薬（PPI/H2RA）処方率

分子:退院時に酸分泌抑制薬（PPI/H2RA）が退院時に処方された患者数

分母:退院時にアスピリン内服薬が処方されている18歳以上の患者数

三菱京都病院 / 全施設

